

4. Usando combinación de drogas.

Síntomas de Sobreamplificación:  
**SINTOMAS MENTALES**



- Paranoia extrema
- Agitación extrema
- Aumento de la agresividad
- Ideas de suicidio
- Confusión
- Inquietud
- Hipervigilancia
- Pánico intenso
- Alucinaciones/ilusiones

5. La forma en que una persona consume drogas, ya sea fumándolas, inyectándolas, comiéndolas, inhalándolas o por otras vías, puede tener un impacto en cómo se siente.

8. La salud física.

Causas de sobreamplificación:

Síntomas de Sobreamplificación:

**SÍNTOMAS FÍSICOS**



- Movimientos bruscos
- Inquietud corporal
- Dolor en el pecho
- Rechinar de dientes
- Aceleración del corazón
- Respiración irregular
- Temperatura alta
- Desmayo pero aún respirando

1. Dosis mas altas o tolerancia bajas pueden causar una sobreamplificación.

2. Falta de descanso, especialmente si ha pasado varios días de no dormir.

3. En casa de un extraño en comparación con un lugar seguro con un amigo de confianza.

¿Cuándo "overamping" convierte en sobredosis?

Las sobredosis de estimulantes implican: Sobrecalentamiento/

Ataque de calor

Infarto cerebral

Convulsión

Infarto de corazón

Escanee el código QR para obtener más información



Consejos para prevenir riesgos:



- Efectuarse en autocuidado:
  - dormir, comer, bañarse, y tomar agua.
- Si estás en un lugar nuevo o con gente nueva, baja tus dosis.
- Limitar las combinaciones de drogas, ya que pueden cambiar los efectos de cada droga individual.
- Prestar atención a la dosis.

**"Sobreamplificación" y "Overamping": Sobredosis de Estimulantes**



¿Alguna vez te has sentido demasiado incómodo o raro después de usar estimulantes?

¡Podrías haber experimentado sobreamplificación!

Término se refiere a cuando los efectos de un estimulante como la cocaína o la metanfetamina se vuelven abrumadores, angustiantes o peligrosos.

¿Qué es "sobreamplificación"? "Overamping" es un término en inglés conocido como "overamping".

El término se utiliza para diferenciarlo de una sobredosis de opioides.